

## 附件 2

## 古代经典名方关键信息表（7 首方剂）（征求意见稿）

## 序号 1 苓桂术甘汤

基本信息		现代对应情况					功能主治
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	
《金匱要略》 （汉·张仲景）	茯苓四两，桂枝、白术各三两，甘草二两。 上四味，以水六升，煮取三升，分温三服。	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	55.2g	上四味，以水 1200 毫升煎煮，煮取 600 毫升，分三次温服。	【功效】温阳化饮，健脾利湿。 【主治】中阳不足之痰饮。症见胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.4g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	41.4g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 干燥根和根茎	生品	27.6g		
备注	上列剂量系度量衡原方量折算，若与当今主流用量严重不符，在保证原方比例不变的情况下，结合安全性评价结果确定日服用量。						

## 序号 2 温经汤

基本信息		现代对应情况					功能主治
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	
《妇人大全良方》（宋·陈自明）	当归、川芎、芍药、桂心、牡丹皮、莪术各半两，人参、甘草、牛膝各一两。右咬咀，每服五钱。水一盞半，煎至八分，去滓温服。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	炒当归	20.6g	粉碎成粗末，每服 20g，加水 450 毫升，煎至 360 毫升，去滓温服。	【功效】温经补虚，化瘀止痛。 【主治】血海虚寒，气血凝滞证。症见妇人月经不调，脐腹作痛，脉沉紧。
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	20.6g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	20.6g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	20.6g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. 的干燥根皮	生品	20.6g		
		莪术	姜科植物蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val. 或广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎	醋莪术	20.6g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	41.3g		

		牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl. 的干燥根	生品	41.3g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	41.3g		
备注	<p>1. 鉴于《妇人大全良方》卷首之“辨识修制药物法度”总论性章节中提及诸多药物的炮制，涉及本方中当归条下注明“微炒”，其方法与地方炮制规范中的炒当归接近；涉及本方中甘草条下注明“炙黄”，其方法与地方炮制规范中的炒甘草接近，可参考；涉及本方中莪术条下注明“二味并用湿纸煨炮令香软，细切，或更用盐醋浸泡半日用”，结合现今临床多采用醋制，以减毒增效，因此建议采用醋莪术炮制规格。</p> <p>2. 本方原用量并非每日服量，结合组成剂量和制法折算结果，按日服三次计算，则本方的日服总量为 60 克，各药的日服量如下：当归 5g，川芎 5g，白芍 5g，肉桂 5g，牡丹皮 5g，莪术 5g，人参 10g，甘草 10g，牛膝 10g。</p>						

### 序号3 一贯煎

基本信息		现代对应情况					功能主治
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	
《医方聚度》 (清·钱敏捷)	北沙参、麦冬、当归各一钱五分，枸杞、生地各三钱，川楝子二钱。 水煎服。	北沙参	伞形科植物珊瑚菜 <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根	生品	5.60g	水煎服。	【功效】滋阴疏肝。 【主治】肝阴不足，血燥气郁证。胸脘胁痛，吞酸吐苦，咽干口燥，舌红少津，脉细弦。亦治疝气瘕聚。
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	5.60g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	5.60g		
		枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实	生品	11.19g		
		生地	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根	生品	11.19g		
		川楝子	楝科植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实	生品	7.46g		
备注							

## 序号 4 桃红四物汤

基本信息		现代对应情况					功能主治
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	
《妇科冰鉴》（清·柴得华）	生地三钱（酒洗），当归四钱（酒洗），白芍钱五分（酒炒），川芎一钱，桃仁十四粒（去皮尖研泥），红花一钱（酒洗）。 水煎温服。	生地	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生地（酒洗）	11.19g	水煎温服。	【功效】养血，活血，逐瘀。 【主治】血虚血瘀证。症见妇女月经不调，血多有块，色紫质粘，腹痛腹胀等。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	14.92g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	酒白芍	5.60g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	3.73g		
		桃仁	蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 或山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.的干燥成熟种子	焯桃仁（研泥）	3.78g		
		红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L.的干燥花	红花（酒洗）	3.73g		
备注	鉴于生地、红花炮制方法与当今的主流炮制方法无对应炮制方法，因此延用原方记载的炮制方法。可参考地方标准或自行建立相应炮制方法。						

## 序号 5 升陷汤

基本信息		现代对应情况					功能主治
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	
《医学衷中参西录》（清·张锡纯）	生黄芪六钱，知母三钱，柴胡一钱五分，桔梗一钱五分，升麻一钱。 水煎服。	黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	22.38g	水煎服。	【功效】益气升陷。 【主治】大气下陷证。症见气促急短，呼吸困难，脉沉迟微弱，或参伍不调。
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 干燥根茎	生品	11.19g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根	生品	5.60g		
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根	生品	5.60g		
		升麻	毛茛科升麻属植物升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 或大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom. 或兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 的干燥根茎	生品	3.73g		
备注							

## 序号 6 枇杷清肺饮

基本信息		现代对应情况					功能主治
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	
《医宗金鉴》（清·吴谦）	人参三分，枇杷叶二钱（刷去毛，蜜炙），甘草三分（生），黄连一钱，桑白皮二钱（鲜者佳），黄柏一钱。水一盅半，煎七分，食远服。	人参	五加科人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	1.12g	以水 300 毫升，煎至 210 毫升，食远服。	【功效】清肺经热。 【主治】肺风酒刺。症见面鼻疙瘩，红赤肿疼，破出粉汁或结屑等。
		枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.的干燥叶	蜜炙	7.46g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	1.12g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.或三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C.Y.Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	3.73g		
		桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥根皮	生品	7.46g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.干燥树皮	生品	3.73g		
备注							

## 序号7 二冬汤

基本信息		现代对应情况					功能主治
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	
《医学心悟》（清·程国彭）	天冬二钱（去心），麦冬三钱（去心），花粉一钱，黄芩一钱，知母一钱，甘草五分，人参五分，荷叶一钱。 水煎服。	天冬	百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.的干燥块根	生品	7.46g	水煎服。	【功效】润肺清胃。 【主治】上消。症见烦渴不止，小便频数，脉数乏力等。
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	11.19g		
		天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根	生品	3.73g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	3.73g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎	生品	3.73g		
		荷叶	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.的干燥叶	生品	1.87g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	1.87g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73g		
备注							

注：基本信息填写来源于国家中医药管理局发布的《古代经典名方目录》（第一批）。